

Kochsalz- Belastungstest

Was Sie wissen müssen.
Was Sie beachten müssen.

Ihr behandelnder Arzt hat Ihnen einen
Kochsalz-Belastungstest empfohlen.

Ihr Termin zur Blutentnahme

ist am um Uhr

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an das
Praxisteam:

LIMBACH  GRUPPE

Limbach Gruppe SE
Im Breitspiel 15 | 69126 Heidelberg
www.limbachgruppe.com

Herausgeber: © Limbach Gruppe SE – 04/2018_V1



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt möchte einen Kochsalz-Belastungstest bei Ihnen durchführen. Mit diesem Test lassen sich Funktionsstörungen im Hormonhaushalt der Nebenniere feststellen.

Aus der Bestimmung der Hormonwerte im Rahmen dieses Tests kann Ihr Arzt wichtige Schlussfolgerungen für Ihre weitere Behandlung ziehen.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Medikamente vor dem Test abgesetzt werden müssen. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem behandelnden Arzt.

Diese Anleitung erklärt Ihnen, was Sie vor und am Tage der Durchführung des Tests beachten müssen.

Wichtige Informationen für die Vorbereitung

Am Untersuchungstag

- Sie können am Untersuchungstag frühstücken.

Ablauf

- Planen Sie für die Testdurchführung ca. 5 Stunden ein.
- Zu Beginn wird Ihnen eine Venenverweilkanüle gelegt, aus der die Blutentnahmen erfolgen.
- Die erste Blutentnahme erfolgt mindestens 2 Stunden nach dem Aufstehen. Vor der ersten Blutentnahme müssen Sie ca. 15 Minuten sitzen.
- Nach der Blutentnahme erhalten Sie eine Infusion einer Kochsalzlösung über 4 Stunden. In dieser Zeit sollten Sie in Ruhe verbleiben.
- Die zweite Blutentnahme erfolgt nach Beendigung der Infusion (nach 4 Stunden). Eine Stunde vor dieser Blutentnahme sollten Sie nicht mehr aufstehen (letzter Toilettengang vorher).

Nebenwirkungen

- Während des Testablaufs werden Sie in der Praxis überwacht und auch der Blutdruck wird stündlich gemessen.

Nach dem Test

- Nach einer Beobachtungszeit von ca. 30 Minuten dürfen Sie die Praxis verlassen.